Quantum AminoMax Etiketa

Pomocný rastlinný prípravok

Výrobca: RPC Kvadrat, Ldt, Gagarina Avenue 41/2, section 7, 2nd floor, 61001 Kharkiv, Ukrajina

Dovozca: AgroDynamica, s.r.o., Husitská 344/63, 130 00 Praha 3

Číslo vzájomného uznania : 1626

Zloženie:

Aminokyseliny	Min. 17,8%	Min. 200 g/l
Dusík (N)	Min. 2,1%	Min. 24 g/l
Organický dusík	Min. 2,1%	Min. 24 g/l
Fosfor (P2O5)	Min. 2%	Min. 22 g/l
Draslík (K2O)	Min. 2%	Min. 23 g/l
Celkový organický uhlík (TOC)	Min. 9,8%	Min. 110 g/l
Vodorozpustný bór (B)	0,024%	270 mg/l
Vodorozpustné železo (Fe)	0,049%	550 mg/l
Vodorozpustný zinok (Zn)	0,049%	550 mg/l
Vodorozpustná meď (Cu)	0,049%	550 mg/l
Vodorozpustný mangán (Mn)	0,049%	550 mg/l
Vodorozpustný molybdén (Mo)	0,010%	110 mg/l
Vodorozpustný kobalt (Co)	0,004%	50 mg/l

Hustota 1,1 – 1,15 kg/l

Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v SR.

Rozsah a spôsob použitia:

Pomocný rastlinný prípravok vhodný pre aplikáciu v jednoročných i viacročných plodinách. Obsahuje aminokyseliny, mikro a makro prvky. Prípravok podporuje rast a rozvoj koreňového systému, znižuje dopady stresu najmä v podmienkach sucha a prísušku. Všetky zložky sú pre rastlinu jednoducho a rýchlo dostupné.

Prípravok je možné kombinovať s prípravkami na ochranu rastlín a s ďalšími hnojivami (konzultujte s výrobcami týchto hnojív), neodporúča sa spoločná aplikácia s herbicídmi. Pred použitím v tank-mix vždy uskutočnite test miešateľnosti. Pripravená zmes by nemala mať žiadny sediment, je možné ľahké zakalenie roztoku. Prípravok nie je kombinovateľný s produktmi obsahujúcimi meď a síru, alebo ich deriváty. Nemiešajte s produktmi s minerálnymi olejmi alebo s prípravkami so zásaditým pH.

Aplikácia:

Postrekom: Postrekovací roztok pripravujte tesne pred aplikáciou. Naplňte 2/3 nádrže postrekovača vodou a za stáleho miešania pridávajte prípravok. Potom doplňte nádrž postrekovača vodou na stanovený objem. Spotreba vody je 200-400 l/ha pre poľné plodiny a zeleninu, 500 – 1000 l/ha pre vinič hroznorodý, ovocie a bobuľoviny. Postrek vykonávajte ideálne v ranných alebo večerných hodinách. Neodporúčame vykonávať postrek pri nízkych alebo naopak vysokých teplotách, silnom slnečnom žiarení a vetre.

Medzi jednotlivými aplikáciami dodržujte interval minimálne 7-10 dní.

Kvapková závlaha: Prípravok je možné použiť pre aplikáciu kvapkovou závlahou. Odporúčame 2 – 4 aplikácie v dávke 1 -5 l/ha. Pred a po použití kvapkovej závlahy odporúčame vyčistiť filtre z dôvodu obsahu organických zložiek v hnojive.

Dávkovanie:

Plodina	Termín aplikácie	Dávka l/ha
Ozimná a jarná pšenica a jačmeň	Fáza odnožovania (BBCH 21-29) Fáza steblovania (BBCH 30-49) Fáza voskovej zrelosti (BBCH 83-87)	0,5 0,5 0,5
Kukurica	Fáza 3-5 listov (BBCH 13-15) Fáza 6-8 listov (BBCH 16-18)	0,5 0,5
Slnečnica	2-3 páry listov (BBCH 14-16) 5-6 párov listov (BBCH 30-33)	0,5 0,5
Ozimná a jarná repka, horčica	Od prvého vedľajšieho výhonu a v priebehu predlžovacieho rastu (BBCH 21-39) Pred začiatkom kvitnutia (BBCH 50-61) V priebehu tvorby šešúľ (BBCH 71-79)	0,5 0,5 0,5
Cukrová repa	Fáza riadkovania (BBCH 19-34) Fáza uzatvárania porastu (BBCH 35-39)	0,5 0,5
Sója, hrach	3-5 trojpočetných listov (BBCH 14-16) Od prvého kvetného puku do začiatku kvitnutia (BBCH 51-61) V priebehu tvorby strukov (BBCH 71-79)	0,5 0,5 0,5
Jablone, hrušky	Kvitnutie (BBCH 60-69) Po odkvitnutí (BBCH 71-72) Rast plodov až do zberu (BBCH 74-89) –	0,5 0,5 0,5

	aplikácia v intervale 7-10 dní	
Kôstkoviny	Opadávanie okvetných lístkov (BBCH 67-69) Rast semenníkov (BBCH 71-73) – aplikácia v intervale 7-10 dní	0,5 0,5
Vinič hroznorodý	Fáza kvitnutia (BBCH 61-69) Rast bobúľ (BBCH 71-79) – aplikácia v intervale 7-10 dní	0,5 0,5
Jahody	Od konca kvitnutia do zberu (BBCH 65-89) – aplikácia v intervale 7-10 dní	0,5
Zemiaky	Fáza tvorby postranných výhonov až do zapojenia porastu (BBCH 21-39) Od fázy tvorby kvetov až do uschnutia rastlín (BBCH 51-97) – aplikácia v intervale 7-10 dní	0,5 0,5
Rajčiny, papriky, baklažány	Od fázy kvetu do zrelosti plodov (BBCH 64-89)- aplikácia v intervale 7-10 dní	0,5
Uhorky	Fáza rastu listov (BBCH 13-29) – aplikácia v intervale 7-10 dní Fáza zrenia plodov (BBCH 71-89) – aplikácia v intervale 7-10 dní	0,5 0,5
Mrkva	Fáza 4-6 pravých listov (BBCH 14-16) Fáza rozširovania koreňov až dosiahnutie konečnej veľkosti koreňa (BBCH 41-49) – aplikácia v intervale 7-10 dní	0,5 0,5
Cibuľa, cesnak	Od začiatku tvorby palice až do zberu (BBCH 41-49) – aplikácia v intervale 7-10 dní	0,5
Kapusta	Od fázy formovania hlávky do fázy konečnej veľkosti (BBCH 41-49) – aplikácia v intervale 7-10 dní	0,5

Výstražné označenia, pokyny k ochrane zdravia, bezpečnosti pri práci a k ochrane životného prostredia:
Quantum AminoMax

Varovanie

H302 Zdraviu škodlivý pri požití.
H332 Zdraviu škodlivý pri vdýchnutí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261 Zamedzte vdychovaniu aerosólu.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte ruky.
P270 Pri používaní tohto výrobku nepite, nejedze a nefajčite.

P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Odstráňte obal podľa štátnych predpisov.
Obsahuje 1-hydroxyethylidene 1,1-difosfonová kyselina, draselná soľ (CAS: 67953-76-8).

Pokyny pre skladovanie a manipuláciu:

Prípravok je potrebné skladovať v uzavretých originálnych obaloch, čistých uzamknutých a chladných skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, kyselín, liehov, olejov, horľavých látok a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom, teplotami pod 0 ^{o}C a nad + 40 ^{o}C, pred vlhkom a mechanickým poškodením. Zaistite, aby v priebehu skladovania nedochádzalo k častému kolísaniu teplôt.

Doba použiteľnosti:

36 mesiacov v neporušených obaloch od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.
Výrobok sa dodáva balený. Objem balenia:
Dátum výroby:
Číslo šarže: